IL MACROZOOBENTHOS DI FONDO MOBILE NELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO: UN CONFRONTO TRA GLI ANNI '90 E LO STATO ATTUALE

Nicola Bettoso - ARPA FVG
nicola.bettoso@arpa.fvg.it
Ida Floriana Aleffi - ARPA FVG
floriana.aleffi@arpa.fvg.it
Lisa Faresi - ARPA FVG
lisa.faresi@arpa.fvg.it
Alessandro Acquavita - ARPA FVG
alessandro.acquavita@arpa.fvg.it
Claudia Orlandi - ARPA FVG
claudia.orlandi@arpa.fvg.it

INTRODUZIONE

- ❖ La Laguna di Marano e Grado è la più settentrionale del Mar Mediterraneo e la seconda per estensione in Italia con circa 160 km²;
- ❖ Essa rappresenta una delle lagune meglio conservate nell'intera area mediterranea: è protetta dalla convenzione di Ramsar ed è inserita nella rete Natura 2000 (SCI - IT3320037);
- ❖ I primi lineamenti sulla composizione della macrofauna bentonica di fondo mobile furono tracciati da Vatova negli anni '60;
- ❖ Il primo studio esaustivo sull'ecologia del macrozoobenthos di fondo mobile della laguna è stato condotto dall'Università di Trieste, dal 1993 al 1995.

MATERIALI E METODI

- ❖ Ai sensi della Dir. WFD-2000/60/CE la laguna è stata suddivisa in 17 corpi idrici sulla base della tipologia alina: corpi idrici eualini (TEU) con salinità 30-40, polialini (TPO) salinità 20-30 e mesoalini (TME) salinità 5-20; FM sono corpi idrici fortemente modificati;
- ❖ Campionamento con benna van Veen (0,047 m²) e 4 repliche per stazione;
- ❖ Setaccio 1mm di maglia;
- ❖ 1993, 1994 e 1995 campionamento annuale su 53 stazioni (tot. St. 159);
- ❖ 2008, 2011, 2014, 2018, 2021 campionamento triennale su 22 stazioni (tot. St. 106).

RISULTATI

Numero medio di taxa per corpo idrico

(in rosso 1993-95, in azzurro 2008-21)

Valore medio indice di Shannon-Wiener

(in rosso 1993-95, in azzurro 2008-21)

Dendrogramma tipologia alina/anno

- ❖ Il confronto tra il periodo 1993-95 e quello 2008-21 ha permesso di rilevare un significativo aumento della ricchezza specifica e dell'indice di diversità di Shannon-Wiener grazie soprattutto al taxon Polychaeta, il più rappresentativo nei sedimenti fangosi anche in termini di abbondanza degli individui;

- ❖ Il dendrogramma di somiglianza tra le tipologie aline di ogni anno ha raggruppato insieme tutti i corpi idrici mesoalini (TME) a prescindere dall'anno (gruppo A);
- ❖ I corpi idrici polialini (TPO) ed eualini (TEU) invece sono risultati raggruppati in funzione del periodo: 1993-95 (gruppo B) e 2008-21 (gruppo C);

Grado di disturbo ambientale (valore medio indice AMBI)

	1993	1994	1995	2008	2011	2014	2018	2021
TME	3,13	2,7	2,95	3,05	3	3	3,22	3,1
TPO	2,67	2,66	2,15	3,49	3,07	3,29	2,78	3,03
TEU	2,68	2,11	0,69	3,13	3,11	3,09	2,94	2,27

- indisturbato
- leggermente disturbato
- moderatamente disturbato

Specie caratteristiche biocenosi lagunare euriterma ed eurialina (LEE)

Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890)

Abra segmentum (Récluz, 1843)

Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776)

- ❖ L'applicazione dell'indice di disturbo ambientale (AMBI) ha evidenziato che, in tutti i corpi idrici ed in tutti gli anni, la comunità macrozoobentonica è mediamente caratterizzata da un lieve grado di disturbo;

Affinità biocenosi bentoniche *sensu* Pères & Picard

TME	1993_95	2008_21
Aff% LEE	65,6	65,0
Aff% SFS	5,3	9,5
Aff% SVMC	29,1	25,5
Wilcoxon pair test		ns

TEU	1993_95	2008_21
Aff% DC	9,9	0,0
Aff% DE	0,0	1,3
Aff% LEE	38,8	23,4
Aff% SFBC	16,2	25,0
Aff% SFS	7,6	11,6
Aff% SVMC	27,5	29,6
Aff% VTC	0,0	9,1
Wilcoxon pair test		ns

TPO	1993_95	2008_21
Aff% LEE	29,5	27,3
Aff% SFBC	9,5	6,1
Aff% SFS	7,9	8,4
Aff% SVMC	25,9	29,1
Aff% VTC	27,2	29,1
Wilcoxon pair test		ns

- ❖ L'assetto delle biocenosi bentoniche è sostanzialmente invariato, sebbene si rilevi una tendenza all'aumento delle biocenosi tipicamente marine nei corpi idrici più vicini al mare (TEU);

CONCLUSIONI

- ❖ Nell'arco di un trentennio è stato possibile constatare un incremento del numero di specie soprattutto nelle aree più ricambiate della laguna;
- ❖ E' ormai noto che l'aumento del livello medio del mare sta determinando un processo di marinizzazione delle lagune alto adriatiche;
- ❖ L'ulteriore evoluzione di questo scenario potrà probabilmente condurre addirittura ad un miglioramento dello stato ecologico *sensu* WFD, ma con la perdita dei connotati peculiari delle lagune, caratterizzate da una minore diversità specifica rispetto al mare e viceversa da una maggiore produttività, soprattutto ai fini della pesca e acquacoltura.